codificam essas proteínas originam
mutose. Mutações nos genes que
reformação do envelope durante a
transcrição e a desmontagem/
coordena a replicação, também
mecânica ao núcleo; também
cromatina e conferindo resistência
envelope nuclear, ancorando a
que reveste a face interna do
intermediários do tipo V (lamínas)
arranjo de filamentos
A lâmina nuclear é um

Introdução

Rafael Pegoraro
Isabela Xavier

Laminopatias

as laminopatias, um conjunto de
cerca de vinte doenças
caracterizadas por desorganização
da lâmina e consequente
instabilidade nuclear.

Aspectos genéticos

Clinicamente, as laminopatias
agrupam-se em cinco grandes
quadros: distrofias musculares
esqueléticas, cardiomiopatias,
lipodistrofias, neuropatias
periféricas e síndromes de
envelhecimento precoce. Esses
problemas podem ocorrer
isoladamente ou em combinação e
afetam sobretudo tecidos de
origem mesenquimal—músculo
esquelético e cardíaco, tecido
adiposo, osso e conjuntivo.

<https://atin.icb.usp.br/>

Texto completo online
com figuras

base de vários fenótipos
patológicos.

Entre as laminopatias, duas
entidades recebem destaque. A
distrofia muscular de Emery-
Dreifuss (DMED1) manifesta-se por
contraturas precoces dos tendões
de Aquiles e cotovelos, fraqueza
muscular progressiva e arritmias
ou cardiomiopatia. Há três formas
hereditárias: ligada ao X (mutação
na emeryina), autossômica
dominante e autossômica recessiva
(ambas associadas a variantes em
LMNA). Embora não exista cura,
fisioterapia, reabilitação motora e
vigilância cardiológica reduzem
complicações. A síndrome de
Hutchinson-Gilford (HGPS,

No nível molecular, há lamínas dos
tipos A (gene LMNA no
cromossomo 1) e B (genes LMNB1
no cromossomo 5 e LMNB2 no
cromossomo 19). O LMNA gera,
por splicing alternativo, quatro
isoformas (lamínas A, C, AΔ10 e C2).

Todas compartilham um domínio
α-hélice central, caudas globulares
e um sinal NLS; muitas apresentam
na cauda o motivo -CAAX, que
direciona a farnesilação pós-
traducional indispensável à
ancoragem no envelope e à
interação com a membrana
interna. Alterações que impedem
esse processamento produzem
proteínas instáveis ou
permanentemente farnesiladas,

“progeria clássica”) resulta de
deleção de 50 aminoácidos na
prelamina A, impedindo a clivagem
da farnesila e gerando a proteína
tóxica progerina. As crianças
exibem crescimento deficiente,
alopecia, face característica,
lipodistrofia, osteólise e grave
cardiopatía que limita a sobrevida;
inibidores de farnesiltransferase
estão em estudo, mas a doença
permanece sem tratamento
específico. Outras laminopatias
incluem as síndromes de Werner
atípica, Barraquer-Simons,
Buschke-Ollendorff, Charcot-Marie-
Tooth, displasia de Greenberg,
distrofia muscular cinturas, doença
de Pelizaeus-Merzbacher,

humanas e animais.